# CONTROL PKU 3 *Plus*

Este produto constitui numa mistura de aminoácidos, isento de fenilalanina, adicionado de vitaminas e minerais. Formulado especialmente para ser utilizado na dieta de fenilcetonúricos e portadores de hiperfenilalaninemia com idade acima de 8 anos.

**Modo de preparo**: Dissolva uma colher medida (5g) em 50mL de água agitando com a colher, até total dissolução.
Utilizar água previamente fervida e resfriada até atingir temperatura ambiente.

Prepare o CONTROL PKU III *Plus* no momento de ser ingerido. Não aquecer o produto. Os restos do produto ofertado devem ser descartados. A quantidade necessária a ser ingerida diariamente de CONTROL PKU III *Plus* deve ser determinada pelo médico e/ou nutricionista, considerando as características individuais de peso corporal, idade e condição metabólica do paciente. Recomenda-se dividir em pelo menos 3 vezes ao dia a quantidade total de CONTROL PKU III *Plus* indicada pelo médico e/ou nutricionista. O produto pode ser adicionado a preparações líquidas tais como água e sucos.

**Cuidados de conservação**: Conservar em temperatura ambiente (entre 15 e 30ºC) e proteger da luz. Após a abertura e rompimento do lacre, feche bem a embalagem, mantenha-a nas condições descritas acima e consuma o produto dentro de 30 dias.

| CONTROL PKU III *Plus* (Idade acima de 8 anos) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nutrientes** | **Unid.** | **p/ 100g** | **Nutrientes** | **Unid.** | **p/ 100g** |
| Valor energético | kcal / kJ | 364 / 1547 | Taurina | mg | 600 |
| Carboidratos (como maltodextrina) | g | 23 | Cálcio | mg | 1975 |
| Proteína equivalente | g | 68 | Cobre | mcg | 1449 |
| Fenilalanina | g | 0 | Cromo | mcg | 58 |
| Gorduras totais | g | 0 | Ferro | mg | 23 |
| Gordura saturada | g | 0 | Fósforo | mg | 1146 |
| Gordura *trans* | g | 0 | Iodo | mcg | 224 |
| Fibra alimentar | g | 0 | Magnésio | mg | 527 |
| Sódio | mg | 30 | Manganês | mg | 4,0 |
| Aminoácidos totais | g | 81 | Molibdênio | mcg | 79 |
| Ácido L- aspártico | g | 3,85 | Potássio | mg | 882 |
| Ácido L- glutâmico | g | 3,63 | Selênio | mcg | 56 |
| L- Alanina | g | 1,94 | Zinco | mg | 13 |
| L- Arginina | g | 4,49 | Ácido fólico | mcg | 395 |
| L- Carnitina | mg | 600 | Ácido pantotênico | mg | 13 |
| L- Cistina | g | 1,80 | Biotina | mcg | 53 |
| Glicina | g | 1,55 | Colina | mg | 658 |
| L- Glutamina | g | 11,85 | Inositol | mg | 198 |
| L- Histidina | g | 1,79 | Niacina | mg | 40 |
| L- Isoleucina | g | 5,41 | Vitamina A | mcg | 988 |
| L- Leucina | g | 8,77 | Vitamina B 1 | mg | 2,9 |
| L- Lisina | g | 4,87 | Vitamina B 2 | mg | 2,6 |
| L- Metionina | g | 1,75 | Vitamina B 6 | mg | 2,1 |
| L- Prolina | g | 5,83 | Vitamina B 12 | mcg | 4,0 |
| L- Serina | g | 3,90 | Vitamina C | mg | 132 |
| L- Tirosina | g | 7,77 | Vitamina D | mcg | 16 |
| L- Treonina | g | 3,50 | Vitamina E | mg | 26 |
| L- Triptofano | g | 2,33 | Vitamina K | mcg | 105 |
| L- Valina | g | 5,27 | | | |

0206-1217-MC

NCM : 2106.90.30
Fabricado no Brasil

Este produto é um alimento incompleto, portanto a dieta deverá ser acompanhada por uma equipe composta por nutricionista e médico.

FBM FARMA
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

# LINHA **CONTROL PKU**

Conheça nossa linha completa através do site:

**www.fbmfarma.com.br**

Consumir preferencialmente sob orientação de nutricionista ou médico.

**AVISO IMPORTANTE:**

As gestantes e nutrizes precisam ser informadas que o leite materno é o melhor alimento para o lactente. As mães devem ser orientadas sobre a importância de ingerirem uma dieta equilibrada com todos os nutrientes e da importância do aleitamento materno até os dois anos de idade ou mais. Devem ser alertadas que o uso de mamadeiras, de bico e de chupetas pode dificultar o aleitamento materno, particularmente quando se deseja manter ou retornar à amamentação. Cabe ao especialista esclarecer previamente às mães quanto ao custo, risco e impactos sociais desta substituição para o bebê. As mães devem estar cientes da importância dos cuidados de higiene e do modo correto do preparo dos substitutos do leite materno na saúde do bebê. O Ministério da Saúde informa: após os 6 (seis) meses de idade continue amamentando seu filho e ofereça novos alimentos.

Os produtos desta lâmina devem ser utilizados somente sob prescrição de médico ou nutricionista.

Material destinado exclusivamente aos profissionais de saúde, obedecendo à Lei nº 11.265/2006, à Portaria nº 2.051/2001 e à Resolução RDC nº 222/2002. Proibida a distribuição aos consumidores.


FBMFARMA

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

Rua: VP-3D, Qd 8B - Módulos 9/21 - DAIA - Anápolis-GO

CEP.:75.132-085 - Indústria Brasileira - **www.fbmfarma.com.br**

SAC 0800 721 3500 sacfbm@fbmfarma.com.br